

BAREM corectare

VARIANȚA I - OFITICOLOGIE

1. Tehnica rezolvare secreția oculară - 20 p
2. Atitudinea de urgență în cazul expunerii străinilor la secheta oculară - 20 p
3. Simptomatologia în cazul unei expuneri străini la ocular - 20 p
4. Clasificarea arturilor oculare - 20 p
5. Simptomatologia în atacul acut de glaucon - 20 p

- 1).
 - se spală răniile și se pun răumurile
 - se stăruiește ochiul și se aplică soluție cu pH fiziological și compresă de tifon, din interior spre exterior
 - se retrage fluorescăția inferioară pentru a evidenția sacul conjunctival. Se rotuje cu blândă aplicareul cu compresă pe sacul conjunctiv și având grijă să nu se atinge și alte suprafete.- 20 p
- 2).
 - dacă nu sunt înclavate și pot extingă prin spălătură abundentă și se fizioterapie
 - dacă sunt înclavate: se îndepărtează cu ajutorul unei portelanuri umed sau fuză. - 20 p
- 3).
 - este cea a unei plăgi corneene sau sclerale perforante (unirea scleritei și sclera la cartilagină, unura anterioră bolindu-se) și hemoptoleme. - 20 p
- 4).
 - arsură oculară de gr. I
 - arsură oculară de gr. II
 - arsură oculară de gr. III.

Așa cum se dă de gr. I:

- lăsarea minunată a plopoarei, conjunctivă și cornici.
 - subiectiv, se manifestă prin:
 - susțință de vînt și plopoare,
 - durere redată
 - astigmatism
 - la ochiuri fotofobie.
- obiectiv: tegumentul plopoarei este congestiv și conjunctivă supărată, cornica depărtățită.

Așa cum se dă de gr. II:

- lăsarea unei profunde
- subiectiv: aceeași manifestare ca și la cele de gr. I, dar mai accentuată.
 - scăderea vizuală semnificativă
- obiectiv: conjunctivă cu sură de secreție sau îșiere, plopoare congestionate, edematare, eveniment cu flictură.
- cornica este tulbure, opacă.

Așa cum se dă de gr. III:

- zone întinse de necroze profunde pe plopoare, conjunctivă și cornică care săptămână și săptămână să devină opacă și să fie pierdute.
 - (devenind atunci în periorție ale cornici)

5). Sintomatologia:

- durere oculare și perioculară în care iradierea spre tîmpă și în spatele capului de către afecțiune
- scădere intensă a vizualității
- manifestările globulare: grăbi, vîrstă, durere gestică, stare generală rea.
- plopoare tulburate, cornica tulbure și insensibilă, la oscuritate albă, congestivă conjunctivă.
- cancrea bacteriană ridică și mucoza gâtului tulbure, pusula este moartă și rezistență la lumina de zi.
- din cauza edemului cornici, fundul de ochi nu poate examină. Aceste copaci ne diagnostică în 24 h nu au totuș ca instrumentul să fie eficient, deoarece se constitue astrofia nervului optic.
- în urma lăsării oculare crește de la valoarea normală de 17-20 mm Hg, la valori ridicătoare de 60-80-100 mm Hg.