

Subiectul Nr. 1.

Condiție de urgență în care călător
peavă pierd controlul și asigurarea
permisalității călării respiretoriu.

În ceea ce privă de IR. călării gravă faza etio-
patogenă se aplică obiceala, în ceea ce privește
măsurii terapeutice grevante.

- Ilestările supero glottice (cădere lumbului,
perturbarea lichidului oboroditor sau organ-
icătălie în calea aerului) sau oamenilor cheopită
de vîrf, secetă, poluuri sau măcesi din
dile caniculați lucrători și controlatori nici nu.
Să se caută pe răsunare aerostatic - nevoie
respiretorie.
- Pentru a nu pătrunde cădere lumbului și opri-
erea respirației lichidului în obârșia slaviei cu-
capul înălțat și extensiv.
- Împinguerea cutanată și mucoasă și sestrină-
re - oceastor manevră. în prevenție de liperestenzie
aparține în depozită pericolul obilistică pe
slunecarea lumbului în lichidul săculești.
în ceea ce privă cădere în lichid ob-
oroditor, primul gest este hidronegro totalelor
a capului victimelor.

Selectul NR. 2.

Manifestările clănușee:

- se instalează de cele mai multe ori în cursul neptui (COPD cardiosigen)
- dispnée intensă severă, semnante leuse
- respirație palpabilă și zigomatoasă, rete de aer,
- astenie,
- anoxiețate extremă,
- tuse urezătoare (în prima fază), apoi cu spuma sanguinolentă, aerata, caracteristică.
- tremfărăți,
- eranie
- turgescență jugularilor de la nivel gâtului (în COPD cardiosigen)
- reluri subcepționante.
- tațăroale
- FA poate fi urezătoare, normală sau secătoare.

AS. AEMULANT.

SUME ERIC NR. 3.

Şălileul clinic al encefalopatiei hipertensiune acută este:

- cefalee intensă, nubolenă, pulsată.
- naresător
- convulsiuni
- tulburări mintale (stare confuzională)
- tulburări de vedere (fotofobia, diplopie, vedere închisă), și tulburări de aud (acufene, hipoacusie).
- ametria, vertig, elemulărire și ementalarea

Semnele nr. 4.

Simptomatolegia clasică în cölile lăzăre este:

- durerea se determină prin contractie spastică reflexă ale vaselor sau ale căilor lăzăre, urmată de creșterea ale presiunii din arterele lăzăre
- Deluseaza' în hipocondru drept sau în epigastru, se accentuează' progresiv, atingind. intensitatea maximă în cîteva ore și decăză' lăruse sau lent
- Trăsătore' nău refluviul costal dr. în regiunea sternului, reponzoră', în ematul dr.
- gheturi, năvăluri cu conținut alimentar sau lăzăre
- icter
- fieber
- fețe.
- semne leale - vasele lăzăre sunt și palpabile și foarte sensibile, ceea ce se pune în evidență cind lumenul să intrețină profund în timp ce mîna palparei învecindreul drept.

Dacă vasele sunt inflamate, în magnitudine profundă, cind ea atinge mîna efortul de palpare, lumenul rămâne și durere accentuată (semnul Murphy - prezent)

Gelisectul nr. 6.

cauzele HAS sunt:

- leziile ale esofagului

- varice esofagiene

- ulcer peptic al esofagului

- tumoră malignă sau benignă

- sindromul MACCORY-WEISS

- diverticul esofagian, hernie gastrico-transfazică, alte cauze.

- leziile ale stomacului și duodenului

- ulcerul gastric și duodenal (cauza principală - ca mai frecventă ~ 80%)

- ulcerul acut de stres,

- gastrita hemoragică

- tumoră malignă sau benignă ale stomacului și duodenului

- varice gastrice

- tbcumotismul

- leziile ale intestinului subțire prima la unguțul FREITZ;

- hipertensiune portată de diverse cauze.

- boala generală:

- leziile ale varicelor (hemangiome, telangiectazi RENAU-OSLER)

- leziile de sange.

- leziile ale organelor înnecrate

- sange îngâtă (prezentă în sârbi, fături, epistomă, hemoptize); ruptura unei anevrișe, alvee, tumoră, etc.

ASISTENT DEBUTANT.

Sulectul nr. 6.

Cauze ale AVC sunt:

- Ateroscleroză.
- Hipertensiune arterială.
- Endocardite embolizante
- Traumatism cronic
- Malformație vasculară
- Alte cauze:
 - embolii acută
 - dislet
 - intraventriculare acută
 - tumoră cerebrala
 - sindrom hemoragic.

~~PRESIDENT SEBUTANT.~~

Subiectul nr. 7.

Ce se inteleag prin spachet?

Prin spachet se inteleaga persoana sfuțitoare sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate.

Subiectul nr. 8

Ce se inteleag prin procedura de dezinfecție?

Prin dezinfecție se inteleag procedura de distingere a majorității microorganismelor patogene sau napatogene de pe oare suprafață (cu excepția fragmentelor) utilizându-se agenți fizici sau chimici.

Subiectul nr. 9

De ce este suprafața glucidică și antimicrobicele aderante astenice medicale?

Deoarece suprafața glucidică și antimicrobicele sunt.

operăriile entorhinali personalului medical pot duce dezinfecția, dezvoltarea și, în final, reducerea infecțiilor;

b) încasările prevenției și dezvoltarea distribuitorilor infecțiilor pe seccioare de infecție, precum și în inovația tehnologică;

c) identificarea seccioarelor cu nevoie de programe de prevenire intensivă și instruire, precum și evaluarea impactului complementarilor programelor preventive.

Subiectul nr. 10

Timpurile de detinere care se iau dreptă la

- 18.01.01; 18.01.06; 18.01.10⁺.

18.01.01 - stocare asigură.

Serviciile intreprinzătoare - lăzile boare: aer, aer cu fără, călătere, suranguini cu aer, brâncule, lăzile de cizmară, propete, solulăzile de laborator și alte soluții.

~~NU SE PENTRU~~
Partea sau ~~nu de mico~~ folosul, nefolosirea
partea sau nu se menține de exponare depășit, care
nu a intrat în contact cu material potențial
infectuos.

18.01.06 * clinicale ceeașd din sau conținutul
substanțe periculoase.

Hechi, caie, solvenți halogenati, alte tipuri de
solvenți, produse chimice organice și anorganice,
produse reziduale generate în cursul
diagnosticului de laborator, soluții fixatoare
sau de dezvoltare, produse concentrate utilizate
în serviciile de dezinfecție și curățenie,
alte, de formă de lucru.

18.01.10 * deseură de amalgam de clă
stătă ușor de stomatologie; aceste deseuri sunt
desigur periculoase.

Cărțile sau resturile de amalgam (mercur), dintr
ele cărora este un obiectiv de amalgam, coroane
dentare, punți dentare, materiale compozite
polimerizabile, ciment glasscious etc.